

LES MOLLUSQUES DE FRANCE DE LA COLLECTION LOCARD.
MOLLUSQUES TERRESTRES (3^e NOTE). FAMILLE HELICIDÆ (suite).

Par Gustave CHERBONNIER.

Genre Archelix Albers, 1850.

[*Atala* Schumacher, 1817 (pars) ; Moquin-Tandon, 1855 (pars) (non Beck, 1837) ; *Macularia* Martens, 1860 (non Albers, 1850)].

Archelix apalolena (Bourguignat, 1867).

1. — *Helix apalolena* Bourguignat, 1867. AUDE : Fesquel, Fitou, Leucate. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Les Albères, Céret, Collioures, Perpignan, Prades, Salcès [V-9].
2. — *Helix lactea* Michaud, 1831. ALGÉRIE : Alger, Oran. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Perpignan. ILES BALÉARES [V-9].

Genre Eobania P. Hesse, 1915.

[*Archelix*, *Otala*, *Macularia*, Auteurs (pars).]

Eobania vermiculata (Müller, 1774).

Helix vermiculata Müller, 1774. ALPES-MARITIMES : Grasse, Menton, Ile Sainte-Marguerite. AUDE : Carcassonne, Castelnaudary. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. CORSE : Bonifacio, Calvi, Corte, Porto-Vecchio, Saint-Florent. GARD : Montfrin. HÉRAULT : Cabrières, Lieuran-Carrières, Montpellier. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Perpignan. VAR : Saint-Nazaire, Sanary, Toulon. VAUCLUSE : Bollène, Valréas. ESPAGNE : Minorque. ITALIE : Florence, Rome [V-9 et V-10].

Genre Cepaea Held, 1837.

[*Tachea* Leach, 1831 (non Fleming, 1822) ; Moquin-Tandon, 1855.]

Cepaea nemoralis (Linné, 1758).

Helix nemoralis Linné, 1758. AIN : Chevry, Le Colombier, Culoz, Ferney, Hauteville, Miribel, Nantua, Tramoye, Volognat. ALLIER : Moulins. ARIÈGE : Foix. AUDE : Carcassonne, Castelnaudary, Limoux. AVEYRON : Estaing, Hauterives. CALVADOS : Cabourg, Caen, Vire. CHARENTE : Angoulême. CHER : Bourges. CÔTE-D'OR : Châtillon-sur-Seine Heuilley-sur-Saône. CÔTES-DU-NORD : Saint-Quay. EURE : Les Andelys, Evreux, Freneuse-sur-Rille. FINISTÈRE : Ouessant. GARD : Bagnols. GIRONDE : Ile Cazeaux. HAUTES-ALPES : Gap. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HAUTE-SAÔNE : La Rochère. HAUTE-SAVOIE : Amphion, Bonneville, Evian, Thonon. HAUTES-PYRÉNÉES : Tarbes. HÉRAULT : Montpellier. INDRE : Châteauroux. ISÈRE : Crémieu, Saint-Fons, Saint-Geoire, Vau-gris, La Verpillière. LOIRE : Balbigny, Feurs, l'Horme, Montbrison,

Rioges, Saint-Chamond, Saint-Pierre-de-Bœuf, Tapigneux. LOIRE-INFÉRIEURE : Clisson, Cordemais, Nantes. LOIRET : Bouilly. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MAYENNE : Laval. MEURTHE-ET-MOSELLE : Manonville. MORBIHAN : Quiberon. MOSELLE : Bionville. NIÈVRE : Nevers, Saint-Saulge. OISE : Mouy, Sennevières. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains, Céret, Collioures. RHÔNE : Irigny, Le Moulin à Vent, Le Mont d'Or Lyonnais, Lyon, Oullins, Saint-Fons. SAÔNE-ET-LOIRE : Condal. SAVOIE : Aix-les-Bains. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny. SEINE-INFÉRIEURE : Elbeuf, Le Havre, Orival, Rouen. TARN : Albi. VAR : Fréjus. VAUCLUSE : Bollène. VENDÉE : Saint-Jean-de-Mont. SUISSE : Fribourg. SUÈDE. [V-10, 11, 12, 13, 14 et 15.]

Cepaea Nemoralis (Linné).

variété subaustriaca Bourguignat 1880.

Helix subaustriaca Bourguignat, 1880. AIN : Bourg, Hauteville, Miribel, Tramoye. ALPES-MARITIMES : Saint-Martin-de-Lantosque. ARIÈGE : Foix. AVEYRON : Estaing. BASSES-ALPES : Castellane, Digne, Forcalquier, Sisteron. CALVADOS : Cabourg, Caen. CHARENTE-MARITIME : Saintes. CHER : Bourges. CÔTE-D'OR : Châtillon-sur-Seine, Heuilley. DRÔME : Saint-Paul-Trois-Châteaux. EURE : Freneuse-sur-Rille. HAUTES-ALPES : Gap. HAUTE-SAÔNE : La Rochère. HAUTE-SAVOIE : Bonneville. HÉRAULT : Montpellier. INDRE : Châteauroux. ISÈRE : Crémieu, La Grande-Chartreuse, Grenoble, Saint-Geoire. LOIRE : Feurs, Orival, Rioges, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Pierre-de-Bœuf. LOIRE-INFÉRIEURE : Clisson, Cordemais, Nantes. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MEURTHE-ET-MOSELLE : Manonville. MORBIHAN : Quiberon. MOSELLE : Metz. NIÈVRE : Saint-Saulge. NORD : Valenciennes. OISE : Sennevières. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains. RHÔNE : Saint-Fons, Lyon. SAÔNE-ET-LOIRE : Mâcon. SAVOIE : Aix-les-Bains. SEINE-INFÉRIEURE : Elbeuf, Le Havre, Rouen. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny. SEINE-ET-OISE : Versailles. VAUCLUSE : Bollène, Valréas. VENDÉE : Saint-Jean-de-Mont. ITALIE : Vérone. SUISSE : Fribourg, Givisier. [V-15 et 16].

Cepaea hortensis (Müller, 1774).

Helix hortensis Müller, 1774. AIN : Bourg, Chevry, Le Colombier, Culoz, Gex, Miribel, Nantua, Oyonax, Parvès, Tramoye, Volognat. ALLIER : Moulins. ARDÈCHE : Privas. AUDE : Mont-Alaric. AVEYRON : Estaing, Rodez. BASSES-PYRÉNÉES : Salies-de-Béarn, CALVADOS : Cabourg, Caen, Villers-sur-Mer, Vire. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Saintes. CHER : Bourges. CÔTE-D'OR : Châtillon-sur-Seine, Heuilley-sur-Saône, Vonges. EURE : Evreux, Freneuse. EURE-ET-LOIR : Chartres. FINISTÈRE : Ouessant. HAUTES-ALPES : Ventavon. HAUTE-GARONNE : Saint-Gaudens. HAUTES-PYRÉNÉES : Cauterets. HAUTE-SAVOIE : Bonneville, Evian, Seyssel, Thonon. INDRE : Châteauroux, Châtillon-sur-Indre. ISÈRE : Coublevic, Feyzin, Pinsot, Saint-Geoire. JURA. LOIRE : Balbigny, Charlieu, Feurs, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Pierre-de-Bœuf, Salvizinet, Tapigneux, LOIRE-INFÉRIEURE : Clisson, Cordemais, Le Croisic, Nantes, Saint-Nazaire. MAINE-ET-LOIRE : Cholet. MEURTHE-ET-MOSELLE : Boucq,

Manonville. MORBIHAN : Quiberon. MOSELLE : Bionville. NIÈVRE : Nevers, Saint-Saulge. NORD : Douai, Valenciennes. OISE : Cauvigny, Villers-Cauterets. PUY-DE-DÔME : Arlanc. RHÔNE : L'Arbresle, Les Ardillats, Collonges, Largentière, Lyon, Le Mont-d'Or Lyonnais, Oullins, Saint-Fons, Sainte-Foy, Vernaison. SAVOIE : Aix-les-Bains. SAÔNE-ET-LOIRE : Condal. SEINE : Saint-Denis. SEINE-INFÉRIEURE : Elbeuf, Rouen. SEINE-ET-MARNE : Carnetin, Lagny. SEINE-ET-OISE : Meudon, Orsay. SOMME : Abbeville. VAR : Carcès. VAUCLUSE : Bollène, Mont-Ventoux. VENDÉE : Mortagne, Saint-Jean-de-Mont. VOSGES : Plombières. SUISSE : Fribourg, Givisier. DANEMARK [V-16, 17, 18 et 19].

Cepaea sylvatica (Draparnaud, 1801).

1. — *Helix sylvatica* Draparnaud, 1801. AIN : Le Colombier, Col de la Faucille, Fernex, Gex, Hauteville, Montoise, Oyonnax, Saint-Christophe, Villars-en-Dombes, Volognat. BASSES-ALPES : La Condamine à 1.300 mètres, Mont-Glaise, Virayse 2.200 mètres. DRÔME : Beaune d'Hostun, Forêt de Lente, Saint-Nazaire, Romans, Die. ISÈRE : Corps, Engins, Freynet, Feyzin, La Grande-Chartreuse, Le Grand-Son, Grenoble, Hurtières, La Motte-les-Bains, Pinsot, Sablonnière, La Salette, Trept, Villard-de-Lans, Vizille. HAUTES-ALPES : Briançon, Gap. HAUTE-SAVOIE : Bonneville, Evian, Faucigny, Saint-Gervais, Thonon, Vallée du Giffre. JURA : Les Rousses. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Ceret. RHÔNE : Lyon, Oullins. SAVOIE : Moustiers. SUISSE : Château de Laufeu, Fribourg. [V-19 et 20].
2. — *Helix austriaca* Mühlfeld, 1838. AUTRICHE. [V-20].
3. — *Helix condatina* Bourguignat, 1894. DRÔME : Beaune d'Hostun. ISÈRE : La Grande-Chartreuse. [V-20].

Genre Pseudotachea C. Boettger, 1909.

[*Tachea* (pars), *Otala* (pars), de divers auteurs.]

Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801).

1. — *Helix splendida* Draparnaud, 1801. AUDE : Bize, Carcassonne, Montazels, Narbonne, Rennes-lès-Bains, Sallèles, Villegly. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille, Saint-Chamas. GARD : Bagnols, Remoulins, Saint-Ambroix. GERS : Auch. HÉRAULT : Montpellier, Perpignan, Port-Vendres, Ria. VAR : Draguignan, Saint-Zacharie, Sanary, Toulon. [V-20].
2. — *Helix calæca* Bourguignat, 1887. AUDE : Limoux. HÉRAULT : Montpellier [V-20].
3. — *Helix cantæ* Bourguignat, 1880. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Perpignan, Ria. VAR : Callas, Draguignan. [V-20].

Pseudotachea Cossoni (Letourneux, 1877).

Helix Cossoni Letourneux, 1877. BOUCHES-DU-RHÔNE : Carry. VAR : Sanary. [V-20].

Genre Iberellus P. Hesse, 1908.

[*Otala* Moquin-Tandon, 1852 (pars)].

Iberellus Companyoi (Aleron, 1837).

Helix Companyoi Aleron, 1837. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Perpignan.
ESPAGNE : Barcelone. [V-20].

Genre Macularia Albers, 1650.

[*Otala* Moquin-Tandon, 1855 (pars) ; *Murella* Westerlund, 1880 (pars)].

Macularia niciensis (de Férussac, 1821).

1. — *Helix niciensis* Locard, 1894. ALPES-MARITIMES : Antibes, Grasse, environs de Nice, Menton, Saint-Auban, Vence. VAR : Bords de l'Artubie, Camps, Le Martre, Seillans, Toulon. [V-20].
2. — *Helix Niepcei* Locard, 1893. VAR : Seillans. [V-20].

SOUS-FAMILLE TACHEOCAMPYLINÆ.

Genre Tacheocampylaea Pfeiffer, 1877.

[*Campylaea* Beck 1837 (pars), auteurs divers : *Otala* Moquin-Tandon, 1855 (pars)].

Tacheocampylaea Raspailii (Peyraudeau, 1826).

Helix Raspailii Payraudeau, 1826. CORSE : Bastia. [V-20].

Tacheocampylaea Brocardi (Dutailly, 1867).

Helix Brocardiana Dutailly, 1867. CORSE : Bastia. [V-20].

SOUS-FAMILLE MURELLINÆ.

Genre Murella Pfeiffer, 1877.

[*Otala* (pars), *Macularia* (pars), *Iberus*, auteurs divers].

Murella orgonensis (Philbert, 1855).

Helix orgonensis Philbert, 1855. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Orgon, Saint-Chamas. VAR : Environs de Toulon. [V-20].

Genre Marmorana Hartmann, 1844.

Marmorana serpentina (de Férussac, 1821).

1. — *Helix serpentina* de Férussac, 1821. CORSE : Bonifacio, Calvi, Saint-Florent. ITALIE : Pise. [V-20].
2. — *Helix halmyris* Mabille, 1867. VAR : Saint-Cyr. CORSE : Bonifacio, Calvi, Corte. [V-20].

Marmorana serpentina (de Férussac).

variété jaspidea Moquin-Tandon, 1855.

Helix jaspidea Mabille, 1867. CORSE : Bonifacio, Calvi. [V-20].

Marmorana serpentina (de Férussac).

variété hospitans Bonelli, 1836.

Helix hospitans Bonelli, 1836. CORSE : Bonifacio. SARDAIGNE : [V-20].

Marmorana trica (Paulucci, 1822).

Helix trica Paulucci, 1822. VAR : Bandol, Draguignan, Saint-Cyr, Toulon. [V-20].

SOUS-FAMILLE HELICIGONINÆ.

Genre Chilostoma Fitzinger, 1833.

[*Campylaea* Beck, 1837 (pars) ; *Cingulifera* Hela, 1837 (pars) ; *Corneola* Held, 1837 (pars) ; *Zonites* Hartmann, 1842 (non Denys de Montfort)].

Chilostoma cornea (Draparnaud, 1801).

1. — *Helix cornea* Draparnaud, 1801. AUDE : Narbonne. AVEYRON : Estaing. CHARENTE : Angoulême, Puymoyen. GARD : Remoulins, Les Tamaris, Saint-Etienne-des-Sorts. HAUTE-GARONNE : Toulouse, Villefranche-Lauraguais. HÉRAULT : Montpellier. LOT-ET-GARONNE : Agen, Port-Sainte-Marie. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Perpignan, Pratz de Mollo, La Preste. VAR : Ollioules. [V-21].

2. — *Helix olisiana* Locard, 1894. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. [V-21].

Chilostoma cornea (Draparnaud).

variété squammatina Marcel de Serres, 1855.

Helix squammatina Marcel de Serres, 1855. AVEYRON, Estaing, Hauterives, Rodez. CHARENTE : Angoulême, Fléac, Nersac. GARD : Bagnols. HAUTES-PYRÉNÉES : Cadéac. LOT-ET-GARONNE : Agen. [V-21].

Chilostoma Desmoulinsi (Farines, 1834).

1. — *Helix Desmoulinsi* Farines, 1834. HAUTES-PYRÉNÉES : Cauterets. [V-21].

2. — *Helix acroticha* Fischer, 1877. HAUTES-PYRÉNÉES : Cauterets. [V-21].

Chilostoma Desmoulinsi (Farines).

variété Crombezi Millière, 1880.

Helix Crombezi Millière, 1880. ALPES-MARITIMES : Saint-Martin-de-Lantosque. [V-21].

Chilostoma glacialis (Thomas, 1821).

1. — *Helix glacialis* Thomas, 1821. SAVOIE : Lanslebourg, route du Mont-Cenis, Lans-le-Villard, 1.600 mètres, Le Mont-Cenis. [V-21].

2. — *Helix chiophila* Bourguignat, 1882. SAVOIE : Le Mont-Cenis. [V-21].

3. — *Helix crymophila* Locard, 1892. HAUTES-ALPES : SAVOIE : Chamonix, Lans-le-Villard. [V-21].

4. — *Helix lautaretiana* Bourguignat, 1882. SAVOIE : Le Mont-Cenis. [V-21].
5. — *Helix pelvouxiana* Bourguignat, 1882. SAVOIE : Lans-le-Villard. [V-21].

Chilostoma alpina (Faure-Biguet, 1821).

1. — *Helix alpina* Faure-Biguet, 1821. DRÔME : Die. HAUTES-ALPES : Le Galibier à 2.200 mètres. ISÈRE : Bergerie de la Grande-Chartreuse, Mont-Granier à 1.925 mètres, Hurlières à 1.924 mètres, La Salette, Sapey. SAVOIE : Brides-Les-Bains. [V-21].
2. — *Helix peraltata* Locard, 1894. ISÈRE : La Grande-Chartreuse. [V-21].

Chilostoma Fontenillei (Michaud, 1829).

Helix Fontenillei Michaud, 1829. LES ALPES : Col du Fresne, Mont d'Ambiel, Châlet de la Pra, Le Glandar, Mont-Ferrand. DRÔME : Die, Forêt de Leoncel, Montagne de Toulant, Mont du Diois. ISÈRE : La Grande-Chartreuse, Pont-en-Royans, Le Sapey, La Salette. SAVOIE : Brides, Chalet du Saut à 2.500 mètres, Lanslebourg. [V-21].

Chilostoma zonata (Studer, 1820).

Helix gallica Bourguignat, 1882. HAUTES-ALPES : Briançon. [V-21].

Chilostoma cingulata (Studer, 1820).

1. — *Helix cingulata* Studer, 1820. ALPES-MARITIMES : Antibes, Menton. ITALIE : Vérone. [V-21].
2. — *Helix amathia* Bourguignat, 1882. ALPES-MARITIMES : Menton, Saorgio, Sospel. [V-21].

Genre Helicigona de Férussac, 1821.

[*Carocolla* de Lamarck, 1822 ; *Chilotrema* (Leach) Turton, 1831 ; *Latomus* Fitzinger, 1837 ; *Lenticula* Held, 1837 ; *Vortex* Moquin-Tandon, 1855 (non Humphrey, 1797 ; non Oken, 1815.)]

Helicigona lapicida (Linné, 1758).

1. — *Helix lapicida* Linné, 1758, AIN : Montagne de Parvès. ARIÈGE : Bastide de Sérou. AUDE : Quillan. AVEYRON : Estaing. BASSES-ALPES : Castellane. CHARENTE : Angoulême, Puymoyen. DRÔME : Hauterives. EURE : Vernon. FINISTÈRE : Brest. HAUTE-GARONNE : Cierp. HAUTES-PYRÉNÉES : Cauterets, Lourdes, Lac d'Oredon à 2.500 mètres, Tarbes. HAUT-RHIN : Enseshein. HAUTE-SAVOIE : Amphion, Evian, Gorges du Fier, Saint-Gervais. ISÈRE : Allevard, Bramefarine, Charlieu, Crémieu, La Grande-Chartreuse, Grenoble, Sassenage, Saint-Quentin, La Verpillière, Vienne. LOIRE : Rochetaillée, Tapigneux. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. MANCHE : Cherbourg. MEURTHE-ET-MOSELLE : Manonville. MOSELLE : Bionville. NIÈVRE : Château-Chinon, Saint-Saulge. OISE : Villers-Cotterets. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Collioures, La Preste, Vernet. PUY-DE-DÔME : Clermont-Ferrand. RHÔNE : Le Mont-d'Or Lyonnais. SAVOIE : Hautecombe. SEINE-ET-OISE : Meudon, Orsay. VAR : Rians, Saint-Maxime. VAUCLUSE : Avignon, Bollène, Valréas. VOSGES : Plombières. SUÈDE. [V-21].

2. — *Helix Lecoqi* Locard, 1894. AIN : Montagne de Parvès. HAUTE-SAVOIE : Evian. [V-21].
3. — *Helix Lychnucha* Locard, 1894. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains. RHÔNE : Lyon, Le Mont-d'Or Lyonnais. [V-21].

***Helicogna lapicida* (Linné).**

variété *andorrica* Bourguignat, 1876.

Helix andorrica Bourguignat, 1876. HAUTE-GARONNE : Luchon. [V-21].

Genre *Isognomostoma* Fitzinger, 1833.

[*Plicostoma* Schlüter, 1838 ; *Ulostoma* Albers, 1850 (pars) ; *Triodopsis* Martens, 1860 (pars) non Rafinesque ; *Gonostoma* Westerlund, 1889.]

***Isognomostoma isognomostoma* (Gmelin, 1780).**

Helix isognomostoma Gmelin, 1780. AIN : Gex, Hauteville, Nantua. ISÈRE : Bief du Fourg. La Grande-Chartreuse. RHÔNE : Lyon. VOSGES : Le Mont. SUISSE : Fribourg. [V-21].

Genre *Arianta* Leach, 1831.

***Arianta arbustorum* (Linné, 1758).**

1. — *Helix arbustorum* Linné, 1758. AIN : Bourg, Col de la Faucille, Gex, Nantua, Seyssel, Villars-en-Dombes, Volognat. ALLIER : Moulins. CÔTE-D'OR : Auxonne. DOUBS : Besançon, Pontarlier. DRÔME : Montagne de Lente. HAUTES-ALPES : Gap. HAUTE-SAVOIE : Evian, Saint-Gervais, Thonon. ISÈRE : Crémieu, Grenoble, Moirans, Saint-Marcellin, Solaise, Villars-de-Lans, Voiron. LOIRE-INFÉRIEURE : Cordemais : MEURTHE-ET-MOSELLE : Boucq. NIÈVRE : Guerigny, Nevers. RHÔNE : Lyon, Saint-Fons. SAÔNE-ET-LOIRE : Charolles, Condal. SAVOIE : Col du Fresne près Chambéry. SEINE-ET-MARNE : Lagny. SEINE-ET-OISE : Chaville, Neuilly-sur-Marne. VOSGES : Epinal, Plombières, Remiremont. SUISSE : Fribourg. SUÈDE. [V-21 et 22].
2. — *Helix albulana* Bourguignat, 1889. AUBE : Troyes. ISÈRE : La Grande-Chartreuse. MOSELLE : Metz. SEINE-ET-MARNE : Lagny. SUÈDE. [V-22].
3. — *Helix Feroeli* Bourguignat, 1889. AIN : Nantua. HAUTE-SAVOIE : Evian. ISÈRE : La Grande-Chartreuse, Gex. SAVOIE : Modane. [V-22].
4. — *Helix hypnicola* Mabilie, 1882. AIN : Col de la Faucille, Seyssel. HAUTE-SAVOIE : Bonneville. ISÈRE : La Grande-Chartreuse. SUISSE : Fribourg. [V-22].
5. — *Helix nazarina* Bourguignat, 1889. ISÈRE : Sainte-Geoire. [V-22].
6. — *Helix picea* Zeigler, 1835. ISÈRE : La Grande-Chartreuse. [V-22].
7. — *Helix thamnivaga* Mabilie, 1889. PUY-DE-DÔME : Clermont-Ferrand. VOSGES : Lac des Corbeaux, Remiremont. [V-22].
8. — *Helix trochoidalis* Roffiaen, 1889. DOUBS : Besançon. HAUTE-SAVOIE : Evian, Thonon. ISÈRE : La Grande-Chartreuse, Grenoble. MEURTHE-ET-MOSELLE : Boucq. SEINE-ET-MARNE : Chalifert. [V-22].
9. — *Helix vibrayana* Bourguignat, 1889. HAUTES-ALPES : Mont-Viso. HAUTE-SAVOIE : Thonon. [V-22].

Arianta arbustorum (Linné).

variété alpicola de Charpentier, 1837.

Helix alpicola de Charpentier, 1837. AIN : Col de la Faucille, Hauteville, Nantua. CÔTE-D'OR : Auxonne. DOUBS : Pontarlier. HAUTE-SAVOIE : Bonneville, Evian, Saint-Gervais, Saint-Jean-de-Maurienne, Thermignon à 1.300 mètres, Thonon. ISÈRE : Chartreuse de Portès, le Grandson, Pinsot. SAVOIE : Bourg-Saint-Maurice, Le Reposoir, Lanslebourg. [V-22].

Arianta arbustorum (Linné).

variété Repellini de Charpentier, 1852.

Helix Repellini de Charpentier, 1852. AIN : Villars-en-Dombes, Volognat, BASSES-ALPES : La Condamine à 1.300 mètres. HAUTES-ALPES : Abriès à 1.550 mètres, Col de la Traversette à 2.500 mètres. HAUTE-SAVOIE : Thonon. ISÈRE : La Grande Chartreuse, Grenoble, Saint-Fons. RHÔNE : Lyon. [V-22].

Arianta arbustorum (Linné).

Variété Xatarti Farines, 1834.

1. — *Helix Xatarti* Farines, 1834. PYRÉNÉES-ORIENTALES : La Preste à 2.200 mètres. [V-22].
2. — *Helix camprodunica* Kobelt, 1883. PYRÉNÉES-ORIENTALES : La Preste. [V-22].

Genre Elona H. et A. Adams, 1855

[*Sterna* Adam, 1850 (nom. préoc.) ; *Corneola* Moquin-Tandon, 1855.]

Elona quimperiana (de Férussac, 1821).

Helix quimperiana de Férussac, 1821. BASSES-PYRÉNÉES : Hendaye, Mont de Lahune. CÔTES-DU-NORD : Forêt de Lorge. FINISTÈRE : Brest, Morlaix, Quimper. [V-23].

Elona pyrenaica (Draparnaud, 1805).

1. — *Helix pyrenaica* Draparnaud, 1805. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Pratz de Mollo, La Preste, Vernet-les-Bains. [V-23].
2. — *Helix xanthelæa* Bourguignat, 1879. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Pratz de Mollo, La Preste. [V-25].

Laboratoire de Malacologie du Muséum.